

# REANIMATIE IN HET ZIEKENHUIS



LET OP  
EIGEN  
VEILIGHEID

Gecollabeerde/zieke patiënt

Roep om hulp en beoordeel patiënt

**Tekens van leven?**

Beoordeel bewustzijn  
en normale ademhaling  
Geoefende ALS hulpverleners moeten  
tegelijktijd de carotispols nakijken

Neen of bij enige twijfel  
(Hartstilstand)

Ja  
(Medische urgentie)

**Bel en haal op\***

Bel naar het reanimatieteam  
Haal alle reanimatiemateriaal op

**Bel en haal op\***

Bel naar het reanimatieteam of het  
Medisch urgentieteam, indien nodig  
Haal alle reanimatiemateriaal op

**CPR van hoge kwaliteit\***

Geef hoge kwaliteit CPR met zuurstof  
en luchtweg hulpmiddelen\*  
Alterneer met de compressor bij  
elke hartritmebeoordeling

**Beoordeel\***

met ABCDE – herken & behandel  
Geef high-flow zuurstof  
(titreer volgens SpO<sub>2</sub> zo mogelijk)  
Leg de monitor aan  
Zorg voor een IV toegang  
Overweeg reanimatie- of medisch  
urgentieteam te alarmeren (zo niet reeds  
gebeurd)

**Defibrillatie\***

Leg elektroden aan/zet de AED aan  
Defibrilleer indien aangewezen\*\*

**Overdracht**

Draag patiënt over aan het reanimatie-  
of medisch urgentieteam  
gebruik SBAR-methode

**Geavanceerde reanimatie**

Wanneer er voldoende opgeleid  
personeel aanwezig is

**Overdracht**

Draag patiënt over aan het  
reanimatieteam  
gebruik SBAR-methode

\* Gelijktijdig acties ondernemen als er voldoende personeel beschikbaar is

\*\* Gebruik een handmatige defibrillator indien getraind en apparaat beschikbaar