

5 TOP MESSAGES

* 0-18 ans, excepté les nouveaux-nés

1. Utiliser l'ABCDE comme langage commun
- Travailler en équipe - Être compétent

2. Titrer l'oxygène pour une SpO₂ de 94 à 98%
- uniquement si la mesure est impossible, débiter l'O₂ à haut débit en fonction des signes d'insuffisance circulatoire et/ou respiratoire.

3. En cas de « choc », administrer 1 ou plusieurs bol(s) de liquide(s) à 10 mg/kg de cristalloïdes (de préférence équilibrés) ou des produits sanguins. Réévaluer après chaque bolus. Débiter précocément les agents vasoactifs.

4. Pour la RCP de base, suivre l'algorithme PBLIS spécifique (abc - 15:2) si vous êtes formé. L'amélioration de la qualité de la RCP et la minimisation des interruptions sont essentielles. Faire attention à la sécurité de l'intervenant.

5. Pour la RCP médicalisée, suivre l'algorithme PALS spécifique. Rechercher et traiter activement les causes réversibles. Utiliser la VMB à 2 personnes comme ventilation de première ligne. Ce n'est qu'après l'intubation que la ventilation asynchrone sera appliquée avec une fréquence liée à l'âge (10-25/minute).